

## **HOJA DE INFORMACIÓN DE BIKTARVY® (bictegravir, emtricitabina, tenofovir alafenamida)**

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Principios activos: <b>bictegravir 50 mg, emtricitabina 200 mg, tenofovir alafenamida 25 mg</b></p> <p>Vía: <b>ORAL</b></p> <p>Forma farmacéutica: <b>COMPRIMIDOS</b></p> <p>Posología: <b>1 comprimido al día CON O SIN ALIMENTOS</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **¿Cómo debe tomar este medicamento?**

Tome la dosis prescrita con un vaso de agua siempre a la misma hora.

Los comprimidos deben tragarse enteros. No debe partarlos, triturarlos o masticarlos.

### **¿Cómo debe conservarse este medicamento?**

Este medicamento debe conservarse a **TEMPERATURA AMBIENTE (20-25º)**.

Guárdelo BIEN CERRADO y dentro de su embalaje para protegerlo de la luz y la humedad. La cocina y el baño no son lugares adecuados para almacenar medicamentos.

Manténgalo fuera del alcance y la vista de los niños.

### **¿Qué debe hacer si se olvida de tomar una dosis o vomita?**

**Si ha olvidado** tomar BIKTARVY® tome la dosis lo más pronto posible y continúe con la pauta habitual. Si han pasado más de **18 horas** desde la hora habitual, deberá esperar a la siguiente toma programada.

**Nunca tome una dosis doble** para compensar una dosis olvidada.

**Si vomita** antes de que transcurra 1 hora de haber tomado BIKTARVY®, tome otra dosis y continúe con la pauta habitual.

### **Precauciones a tener en cuenta**

- Informe a su médico/a si ha sufrido o sufre alguna enfermedad del hígado, tiene signos de infección o problemas articulares u óseos.
- Informe a su médico/a si está embarazada o cree que podría estarlo.
- No se debe utilizar BIKTARVY® durante el período de lactancia.

## ¿Cuáles son los efectos secundarios que pueden aparecer?

---

BIKTARVY® puede causar efectos adversos aunque no todas las personas las sufran:

- **Alteraciones gastrointestinales** (diarrea, náuseas, dolor abdominal)
- **Dolor de cabeza, mareo.**
- **Alteraciones del sueño** (sueños anómalos, insomnio)
- **Fatiga**
- **Aumento del colesterol**

Si considera que alguno de las reacciones adversas que sufre es grave o si aprecia cualquier reacción adversa no mencionada, informe a su médico/a o farmacéutico/a.

## Interacciones

---

Algunos medicamentos pueden reducir la efectividad o aumentar la toxicidad de BIKTARVY®, por contra, BIKTARVY® puede alterar también el efecto de otros medicamentos. Informe a los profesionales sanitarios que le atienden antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal.

En caso de acidez de estómago, los antiácidos que contengan **magnesio y/o aluminio** (tipo Almax® o similares) deben separarse de la toma de BIKTARVY®. Se recomienda tomar BIKTARVY® al menos 2 horas antes del antiácido, o bien tomarlo con alimentos 2 horas después del antiácido.

Los suplementos o preparados **multivitamínicos** que contengan **calcio, hierro y/o magnesio** deben separarse de la toma de BIKTARVY®. Se recomienda tomar BIKTARVY® al menos 2 horas antes de los suplementos, o bien tomarlos conjuntamente con alimentos.

El consumo de pomelo o hierba de San Juan (hipérico) están contraindicados ya que pueden incrementar los efectos adversos.

Este documento no contiene toda la información sobre el medicamento ya que solo es un resumen para ayudar al paciente a realizar correctamente el tratamiento.

Para cualquier duda o consulta sobre los medicamentos, llámenos al **93 553 73 41 (8-14h)** o escríbanos ([farmaciaambulatoria@santpau.cat](mailto:farmaciaambulatoria@santpau.cat)).