

HOJA DE INFORMACIÓN DE DOVATO® (dolutegravir/lamivudina)

	<p>Principio activo: dolutegravir 50 mg, lamivudina 300 mg</p> <p>Vía: ORAL</p> <p>Forma farmacéutica: comprimidos recubiertos con película</p> <p>Posología: 1 comprimido al día CON O SIN ALIMENTOS</p>
---	---

¿Cómo debe tomar este medicamento?

Tome la dosis prescrita con un vaso de agua y siempre a la misma hora.

Los comprimidos deben tragarse enteros. No debe partirlos, triturarlos o masticarlos.

¿Cómo debe conservarse este medicamento?

Debe conservarse a **TEMPERATURA AMBIENTE (20-25º)**.

Guárdelo BIEN CERRADO y dentro de su embalaje para protegerlo de la luz y la humedad. La cocina y el baño no son lugares adecuados para almacenar medicamentos.

Manténgalo fuera del alcance y la vista de los niños.

¿Qué debe hacer si se olvida de tomar una dosis?

Si ha olvidado tomar DOVATO®, tome la dosis lo antes posible y continúe con la pauta habitual. Si han pasado más de **20 horas** desde la hora habitual, deberá esperar a la siguiente toma programada.

Nunca tome una dosis doble para compensar una dosis olvidada.

Si no recuerda si lo ha tomado o no, NO TOME otra dosis

Precauciones a tener en cuenta

- Informe a su médico/a si ha sufrido o sufre una enfermedad del hígado o de los riñones.
- Las mujeres en edad fértil deben utilizar **métodos anticonceptivos** de barrera durante el tratamiento.
- Informe inmediatamente a su médico/a si está embarazada o cree que podría estarlo.

- No se debe utilizar DOVATO® durante el período de lactancia.

¿Cuáles son los efectos secundarios que pueden aparecer?

DOVATO® puede causar efectos adversos aunque no todas las personas las sufran:

- **Dolor de cabeza**
- **Alteraciones gastrointestinales** (diarrea, náuseas, vómitos, flatulencia, dolor abdominal)
- **Alteraciones del sueño** (sueños anómalos, insomnio, somnolencia)
- **Cambios en el estado de ánimo**
- **Erupción cutánea**
- **Dolor en las articulaciones**
- **Cansancio, mareo**

Si considera que alguno de las reacciones adversas que sufre es grave o si aprecia cualquier reacción adversa no mencionada, informe a su médico/a o farmacéutico/a.

Interacciones

Algunos medicamentos pueden reducir la efectividad o aumentar la toxicidad de DOVATO®, por contra, DOVATO® puede alterar también el efecto de otros medicamentos. Informe a los profesionales sanitarios que le atienden antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal.

En caso de acidez de estómago, los antiácidos que contengan **magnesio y/o aluminio** (tipo Almax® o similares) se deben administrar como mínimo 6 horas antes de DOVATO®, o bien, 2 horas después.

Los suplementos que contengan **calcio, hierro y/o magnesio o preparados multivitamínicos** se deben tomar como mínimo 6 horas antes de DOVATO®, o bien, tomarlos conjuntamente con alimentos.

El consumo de pomelo o hierba de San Juan (hipérico) están contraindicados ya que pueden incrementar los efectos adversos.

Este documento no contiene toda la información sobre el medicamento ya que solo es un resumen para ayudar al paciente a realizar correctamente el tratamiento.

Para cualquier duda o consulta sobre los medicamentos, llámenos al **93 553 73 41 (8-14h)** o escríbanos (farmaciaambulatoria@santpau.cat).