

HOJA DE INFORMACIÓN DE ODEFSEY® (rilpivirina, emtricitabina, tenofovir alafenamida)



Principios activos: **rilpivirina 25 mg, emtricitabina 200 mg, tenofovir alafenamida 25 mg**

Vía: **ORAL**

Forma farmacéutica: **COMPRIMIDOS**

Posología: **1 comprimido al día CON ALIMENTOS (400 kcal)**

¿Cómo debe tomar este medicamento?

Tome la dosis prescrita con un vaso de agua siempre a la misma hora después de una comida de al menos 400 kcal.

Los comprimidos deben tragarse enteros. No debe partarlos, triturarlos o masticarlos.

¿Cómo debe conservarse este medicamento?

Este medicamento debe conservarse a **TEMPERATURA AMBIENTE (20-25º)**.

Guárdelo BIEN CERRADO y dentro de su embalaje para protegerlo de la luz y la humedad. La cocina y el baño no son lugares adecuados para almacenar medicamentos.

Manténgalo fuera del alcance y la vista de los niños.

¿Qué debe hacer si se olvida de tomar una dosis o vomita?

Si ha olvidado tomar ODEFSEY® tome la dosis lo más pronto posible y continúe con la pauta habitual. Si han pasado más de **12 horas** desde la hora habitual, deberá esperar a la siguiente toma programada.

Nunca tome una dosis doble para compensar una dosis olvidada.

Si vomita antes de que transcurran 4 horas de haber tomado ODEFSEY®, tome otra dosis y continúe con la pauta habitual.

Precauciones a tener en cuenta

- Informe a su médico/a si ha sufrido o sufre alguna enfermedad del hígado, tiene signos de infección o problemas articulares u óseos.

- Informe a su médico/a si está embarazada o cree que podría estarlo.
- No se debe utilizar ODEFSEY® durante el período de lactancia.

¿Cuáles son los efectos secundarios que pueden aparecer?

ODEFSEY® puede causar efectos adversos aunque no todas las personas las sufran:

- **Alteraciones gastrointestinales** (diarrea, náuseas, dolor abdominal).
- **Dolor de cabeza, mareo.**
- **Alteraciones del sueño** (sueños anómalos, insomnio).
- **Fatiga.**
- **Erupción cutánea.**

Si considera que alguno de las reacciones adversas que sufre es grave o si aprecia cualquier reacción adversa no mencionada, informe a su médico/a o farmacéutico/a.

Interacciones

Algunos medicamentos pueden reducir la efectividad o aumentar la toxicidad de ODEFSEY®, por contra, ODEFSEY® puede alterar también el efecto de otros medicamentos. Informe a los profesionales sanitarios que le atienden antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal.

En caso de utilizar antiácidos (hidróxido de aluminio/magnesio o carbonato cálcico), tómelo al menos 2 horas antes o 4 horas después de ODEFSEY®.

Los antagonistas H2 (ranitidina, famotidina, cimetidina), deben tomarse al menos 12 horas antes o al menos 4 horas después de ODEFSEY®. Los antagonistas H2 sólo pueden tomarse una vez al día (NO en una pauta de dos dosis diarias) si está tomando ODEFSEY®.

Por otro lado, los inhibidores de la bomba de protones (omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, esomeprazol, rabeprazol) están contraindicados cuando se está en tratamiento con ODEFSEY® ya que disminuyen su efecto.

El consumo de hierba de San Juan (hipérico) está contraindicado ya que pueden disminuir el efecto de ODEFSEY®.

Este documento no contiene toda la información sobre el medicamento ya que solo es un resumen para ayudar al paciente a realizar correctamente el tratamiento.

Para cualquier duda o consulta sobre los medicamentos, llámenos al **93 553 73 41 (8-14h)** o escribanos (farmaciaambulatoria@santpau.cat).