

HOJA DE INFORMACIÓN DE REZOLSTA® (darunavir/cobicistat)

	Principios activos: darunavir 800 mg/cobicistat 150 mg Vía: ORAL Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS Posología: 1 comprimido al día <u>CON ALIMENTOS</u>
---	--

¿Cómo debe tomar este medicamento?

Tome la dosis prescrita con un vaso de agua siempre a la misma hora.

Los comprimidos deben tragarse enteros. No debe partarlos, triturarlos o masticarlos.

¿Cómo debe conservarse este medicamento?

Este medicamento debe conservarse a **TEMPERATURA AMBIENTE (20-25º)**.

Guárdelo BIEN CERRADO y dentro de su embalaje para protegerlo de la luz y la humedad. La cocina y el baño no son lugares adecuados para almacenar medicamentos.

Manténgalo fuera del alcance y la vista de los niños.

¿Qué debe hacer si se olvida de tomar una dosis o vomita?

Si ha olvidado tomar REZOLSTA® tome la dosis lo más pronto posible y continúe con la pauta habitual. Si han pasado más de **12 horas** desde la hora habitual, deberá esperar a la siguiente toma programada.

Nunca tome una dosis doble para compensar una dosis olvidada.

Si vomita antes de que transcurran 4 horas de haber tomado REZOLSTA®, tome otra dosis y continúe con la pauta habitual.

Precauciones a tener en cuenta

- Informe a su médico/a si ha sufrido o sufre alguna enfermedad del hígado, tiene signos de infección o problemas articulares u óseos.
- Informe a su médico/a si está embarazada o cree que podría estarlo.

- No se debe utilizar REZOLSTA® durante el período de lactancia.

¿Cuáles son los efectos secundarios que pueden aparecer?

REZOLSTA® puede causar efectos adversos aunque no todas las personas las sufran:

- **Alteraciones gastrointestinales** (diarrea, náuseas, dolor abdominal, pérdida de apetito): En caso de aparición de diarrea, siga una dieta astringente (caldo de arroz, patata y zanahoria hervidos...) y beba mucha agua. En caso de náuseas o vómitos o pérdida de apetito, se recomienda comer pequeñas cantidades pero más a menudo (por ejemplo 5 veces al día).
- **Dolor de cabeza, mareo.**
- **Fatiga.**
- **Aumento del colesterol.**
- **Erupción cutánea.**

Si considera que alguno de las reacciones adversas que sufre es grave o si aprecia cualquier reacción adversa no mencionada, informe a su médico/a o farmacéutico/a.

Interacciones

Algunos medicamentos pueden reducir la efectividad o aumentar la toxicidad de REZOLSTA®, por contra, REZOLSTA® puede alterar también el efecto de otros medicamentos. Informe a los profesionales sanitarios que le atienden antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal.

El consumo de pomelo o hierba de San Juan (hipérico) están contraindicados ya que pueden incrementar los efectos adversos.

Este documento no contiene toda la información sobre el medicamento ya que solo es un resumen para ayudar al paciente a realizar correctamente el tratamiento.

Para cualquier duda o consulta sobre los medicamentos, llámenos al **93 553 73 41 (8-14h)** o escríbanos (farmaciaambulatoria@santpau.cat).