

HOJA DE INFORMACIÓN DE TRIUMEQ® (dolutegravir, abacavir, lamivudina)

	<p>Principios activos: dolutegravir 50 mg, abacavir 600 mg, lamivudina 300 mg Vía: ORAL Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS Posología: 1 comprimido al día <u>CON O SIN ALIMENTOS</u></p>
---	---

¿Cómo debe tomar este medicamento?

Tome la dosis prescrita con un vaso de agua siempre a la misma hora.

Los comprimidos deben tragarse enteros. No debe partirlos, triturarlos o masticarlos.

¿Cómo debe conservarse este medicamento?

Este medicamento debe conservarse a **TEMPERATURA AMBIENTE (20-25º)**.

Guárdelo BIEN CERRADO y dentro de su embalaje para protegerlo de la luz y la humedad. La cocina y el baño no son lugares adecuados para almacenar medicamentos.

Manténgalo fuera del alcance y la vista de los niños.

¿Qué debe hacer si se olvida de tomar una dosis o vomita?

Si ha olvidado tomar TRIUMEQ® tome la dosis lo más pronto posible y continúe con la pauta habitual. Si han pasado más de **20 horas** desde la hora habitual, deberá esperar a la siguiente toma programada.

Nunca tome una dosis doble para compensar una dosis olvidada.

Precauciones a tener en cuenta

- Informe a su médico/a si ha sufrido o sufre alguna enfermedad del hígado, tiene signos de infección o problemas articulares u óseos.
- Informe a su médico/a si está embarazada o cree que podría estarlo.
- No se debe utilizar TRIUMEQ® durante el período de lactancia.

¿Cuáles son los efectos secundarios que pueden aparecer?

TRIUMEQ® puede causar efectos adversos aunque no todas las personas las sufran:

- **Alteraciones gastrointestinales** (diarrea, náuseas, dolor abdominal).
- **Dolor de cabeza, mareo.**
- **Alteraciones del sueño** (sueños anómalos, insomnio).
- **Fatiga.**

Si considera que alguno de las reacciones adversas que sufre es grave o si aprecia cualquier reacción adversa no mencionada, informe a su médico/a o farmacéutico/a.

Antes de empezar este tratamiento, le han realizado una prueba para detectar que no es portador del gen HLA-B*5701. Aunque el riesgo es mucho menor si usted no es portador de este gen, esto no excluye totalmente que pueda sufrir una reacción de hipersensibilidad. Las reacciones de hipersensibilidad pueden aparecer en cualquier momento durante el tratamiento con TRIUMEQ®, aunque es más probable que lo hagan en las primeras 6 semanas.

Contacte con su médico inmediatamente si presenta una erupción cutánea o si tiene síntomas incluidos en al menos 2 de los siguientes grupos:

- Fiebre.
- Dificultad respiratoria, dolor de garganta o tos.
- Náuseas o vómitos, diarrea o dolor abdominal.
- Cansancio excesivo o achaques y dolores o malestar general.

Interacciones

Algunos medicamentos pueden reducir la efectividad o aumentar la toxicidad de TRIUMEQ®, por contra, TRIUMEQ® puede alterar también el efecto de otros medicamentos. Informe a los profesionales sanitarios que le atienden antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal.

En caso de acidez de estómago, no tome ningún antiácido (como el hidróxido de aluminio, almagato o magnesio o carbonato cálcico) dentro de las 6 horas antes a la administración de TRIUMEQ®, o dentro de las 2 horas siguientes de la toma porque pueden disminuir la eficacia de TRIUMEQ®. Otros medicamentos que disminuyen la acidez, como ranitidina y omeprazol, pueden tomarse al mismo tiempo que TRIUMEQ®.

Tampoco debe tomar suplementos de calcio, de hierro o preparados multivitamínicos 6 horas antes de tomar TRIUMEQ®, o dentro de las 2 horas siguientes ya que también pueden disminuir su efecto.

Este documento no contiene toda la información sobre el medicamento ya que solo es un resumen para ayudar al paciente a realizar correctamente el tratamiento.

Para cualquier duda o consulta sobre los medicamentos, llámenos al **93 553 73 41 (8-14h)** o escríbanos (farmaciaambulatoria@santpau.cat).